Agromag-Brosura A5 SORTE 2022_Layout 1 13/09/2022 15:17 Page 1



Izbira sort za setev

2022

AgroMag

AGROMAG d.o.o.
Tržaška cesta 65, 2000 Maribor
T: 02 450 35 07, F: 05 992 44 30
M: 031 696 511, M: 031 348 502
e: magda.dulic@siol.net
w: www.agromag.si

GENIUS E

OZIMNA PŠENICA GOLICA - SUPER IZBOLJŠEVALKA (E 9+)



Kakovost in višja dodana vrednost za vse akterje v verigi – pridelovalce, mlinarje in peke

SORTNA ZNAČILNOST

- Odlična vpojnost, izjemno dober prinos testa in volumna po RMT kontroli.
- Visoka sedimentacija in vsebnost kakovostnih beljakovin.

TEHNOLOŠKE ZNAČILNOSTI

- Stabilni pridelki in dobra toleranca na gospodarsko najbolj nevarne bolezni.
- Odlična prilagojenost različnim stresnim rastnim razmeram.

Na osnovi raziskav pekarske industrijske skupnosti v Nemčiji

Z Geniusom do 20.000 žemljic na hektar več!!!



Razvoj					
klasenje / zorenje	srednje pozno / srednje pozno				
prezimitev / tolerantnost na sušo	zelo dobra / zelo dobra				
št. klasov/m2; št.zrn /klasu ; TZT	0	0	0		
Kakovost + + + + = zelo dobra (visoka)	0 = srednja	---- = zelo nizko			
Surove beljakovine:	+ + + +	Meljava:	+ + +		
Sedimentacija:	+ + + +	Vpojnost:	+ + +		
Število padanja:	+ + + +	Prinos volumna:	+ + + +		
Setvena norma:	**Kalivih zrn/m2**	**cca kg/ha**			
Zgodnje setve / konec septembra	220 - 240	160 - 180			
Optimalne setve/sredina oktobra	270 - 310	200 - 220			
Pozne setve/konec oktobra	350 - 400	220 - 240			
N gnojenje (kg / ha, vključno z Nmin),	Razvojna faza (RF)				
Od setve do konca razraščanje	RF 13/25	70-90 kg / ha N			
Intenziven razvoj	RF 31/32	50-70 kg / ha N			
Klasenje	RF 47/49	70-90 kg / ha N			
Višina / stabilnost	Srednje visoka / Dobra				
Regulatorji rasti (če so dovoljeni in v primeru če so posevki zelo razraščeni ali visoki)					
RF 25/29	1,0 l CCC				
RF 31	0,5 - 0,7 l Medax T.				
RF 39	0,4 - 0,3 l Camposan				
Tolerantnost na bolezni ++++=zelo dobra (visoka) 0=srednja ---- = zelo nizko					
Pepelasta plesen : ++++	Septorija lista : 0				
Fuzarioze klasa : + + +	Rumena rja: +++ Rjava rja: ++				
DTR (Pyren. tritici-repentis) : 0					
Uporaba fungicida v intenzivni pridelavi	Septoria lista in DTR zajeti				
	RF 30/32 Fungicidi širokega spektra				
	RF 47/51 Kombinirani fungicidi				

Navodila so podana na osnovi raziskav vodenih na testnih postajah in upoštevajoč večletno dobro kmetijsko prakso. V primeru odstopanja jih je potrebno prilagoditi lokalnim razmeram. Za vse dodatne informacije pokličite svetovalno službo podjetja AgroMag d.o.o. 031 696 511.



NOVO

GHAYTA E

OZIMNA PŠENICA – RESNICA
SUPER IZBOLJŠEVALKA (E 9+)

Visokorodna izboljševalka odličnih pekovskih lastnost

SORTNA ZNAČILNOST

Srednje zgodnja sorta praviloma odlične kakovosti. Resice na klasu učinkovito zmanjšujejo škodo zaradi divjadi in ptičev. Sorta je popolnoma odporna na viruse iz skupine Mosaic, ki jih prenašajo uši zato je zelo primerna za zgodnje setve in setve v optimalnih terminih. Zelo je tolerantna na bolezen trohnenja koreninskega sistema (Phytopthora sp.), ki se pogosto razvije na težjih tleh zaradi visoke vlažnosti tal spomladi ali jeseni in na bolezni iz rodu Fusarium sp.

TEHNOLOŠKE ZNAČILNOSTI

Zelo učinkovito črpa dušik iz tal in je uspešna tudi na slabše založenih tleh. Dobro prenaša morebitne napake pri dognojevanju z dušikom, kar je vidno v zelo dobri stabilnosti posevka.

Primerna za pridelavo v intenzivnih in ekstenzivnih pogojih. Občutljiva na herbicide, ki vsebujejo aktivno snov Chlortoluron

Razvoj				
klasenje / zorenje	zgodnje / srednje zgodnje			
prezimitev / tolerantnost na sušo	zelo dobra / zelo dobra			
št. klasov/m2; št.zrn /klasu ; TZT	++	+	++	

Kakovost + + + + = zelo dobra (visoka)		0 = srednja		---- = zelo nizko
Surove beljakovine:	+ + + +	Meljava:		+ + + +
Sedimentacija:	+ + + +	Vpojnost:		+ + +
Število padanja:	+ + +	Prinos volumna:		+ + + +

Setvena norma:	**Kalivih zrn/m2**	**cca kg/ha**
Zgodnje setve / konec septembra	240 - 270	180 - 200
Optimalne setve/sredina oktobra	310 - 350	200 - 220
Pozne setve/zadnja dekada oktobra	400 - 450	240 - 250

N gnojenje (kg / ha, vključno z Nmin),	Razvojna faza (RF)	
Od setve do konca razraščanje	RF 13/25	70-90 kg / ha N
Intenziven razvoj	RF 31/32	60-70 kg / ha N
Klasenje	RF 47/49	60-70 kg / ha N

Višina / stabilnost	Srednje visoka / srednja
Regulatorji rasti:	
RF 31	0,4 – 0,5 CCC+ 0,15-0,2 Moddus

Tolerantnost na bolezni ++++=zelo dobra (visoka) 0=srednja ---- = zelo nizko	
Pepelasta plesen : +++	Septorija lista : +++
Fuzarioze klasa : +++	Rumena rja: +++ Rjava rja: ++
DTR (Pyren. tritici-repentis) : 0	Mozaik virus: **odporna**
Uporaba fungicida v intenzivni pridelavi	Septoria lista in DTR zajeti
	RF 30/32 Fungicidi širokega spektra
	RF 47/51 Kombinirani fungicidi
	RF 58/65 Fungicid na bazi azola+insekticid
	Ghayta je sorta občutljiva na herbicide iz skupine chlortolurona.



Navodila so podana na osnovi raziskav vodenih na testnih postajah in upoštevajoč večletno dobro kmetijsko prakso. V primeru odstopanja jih je potrebno prilagoditi lokalnim razmeram. Za vse dodatne informacije pokličite svetovalno službo podjetja AgroMag d.o.o. 031 696 511.

ALVIUS E/A

PRESEVNA PŠENICA GOLICA (A/E KAKOVOST)

Za obilen, kakovosten in varen pridelek



SORTNA ZNAČILNOST

ALVIUS izhaja iz ciljanega programa križanja za alternativno pšenico. Tako kot jare pšenice ne potrebuje fazo nizkih temperatur za poznejši generativni razvoj, hkrati pa je za razliko od jarih pšenic odporen na nizke temperature in ima odlično prezimitev. Selekcioniran je za doseganje visokih in kakovostnih pridelkov tudi v primeru pozne jesenske ali zimske setve. Prilagojen je skrajšanemu vegetacijskemu obdobju in v primeru poznih setev prinaša višje pridelke kot klasične sorte ozimne pšenice primerljive kakovosti. To dejstvo omogoča zmanjševanje ustvarjanja delovnih konic in znižuje pritisk škodljivcev in plevelov.

TEHNOLOŠKE ZNAČILNOSTI

Srednje visoka, zelo stabilna in odlično prilagojena različnim stresnim rastnim razmeram.
Dobra toleranca na gospodarsko najbolj nevarne bolezni.
Visok in zelo stabilen pridelek A kakovosti dosega tudi z nižjo zalogo N.



Razvoj			
klasenje / zorenje		srednje pozno / srednje pozno	
prezimitev / tolerantnost na sušo		zelo dobra / zelo dobra	
št. klasov/m2; št.zrn /klasu ; TZT		0 0 0	
Kakovost + + + + = zelo dobra (visoka)		0 = srednja	---- = zelo nizko
Surove beljakovine:	+ + + +	Meljava:	+ + +
Sedimentacija:	+ + + +	Vpojnost:	+ + +
Število padanja:	+ + + +	Prinos volumna:	+ + + +
Setvena norma:		**Kalivih zrn/m2**	**cca kg/ha**
Zgodnje setve / druga oktobra		360 - 400	160 - 180
Poznetve setve / november - december		400 - 450	220 - 240
Spomladanska setev/ januar – prva dekada aprila		420 - 470	240 - 260
N gnojenje (kg / ha, vključno z Nmin),		Razvojna faza (RF)	
Od setve do konca razraščanje		RF 13/25	90-110 / ha N+20-30 S
Intenziven razvoj		RF 31/32	50-60 / ha N
Klasenje		RF 49/59	50-60 / ha N+10-15 S
Višina / stabilnost		Srednje visoka / Dobra	
Regulatorji rasti (če so dovoljeni in v primeru če so posevki zelo razraščeni ali visoki)			
Spomladanska setev RF 25 Spomladanska setev RF 31		0,4 - 0,6 l/ha CCC 0,3 – 0,4 l/ha CCC	
Jesenska setev RF 25 Jesenska setev RF 31		0,5 - 0,7 l/ha CCC 0,3 – 0,4 l/ha CCC	
Tolerantnost na bolezni ++++=zelo dobra (visoka) 0=srednja ---- = zelo nizko			
Pepelasta plesen : ++++		Septorija lista : +++	
Fuzarioze klasa : +		Rumena rja: ++ Rjava rja: ++	
DTR (Pyren. tritici-repentis) : ++			
Uporaba fungicida v intenzivni pridelavi		Septoria lista in DTR zajeti	
		RF 30/32 Fungicidi širokega spektra	
		RF 47/51 Kombinirani fungicidi	

Navodila so podana na osnovi raziskav vodenih na testnih postajah in upoštevajoč večletno dobro kmetijsko prakso. V primeru odstopanja jih je potrebno prilagoditi lokalnim razmeram. Za vse dodatne informacije pokličite svetovalno službo podjetja AgroMag d.o.o. 031 696 511.



FAUSTUS B

PŠENICA GOLICA

Visok in praviloma stabilen pridelek

SORTNA ZNAČILNOST

Visoka učinkovitost uporabe N, kar pomeni manj dušika in CO2 na kg kruha.
Odlično ohranja kakovost in optimalno padno število tudi pri poznem spravilu.
Primerna za setev na vseh tipih tal.
Odlična toleranca na stresne pogoje rasti v kritičnih fazah razvoja.

TEHNOLOŠKE ZNAČILNOSTI

Stabilni pridelki in dobra toleranca na gospodarsko najbolj nevarne bolezni.
Možnost doseganja visokega pridelka v intenzivni in ekstenzivni proizvodnji.

Razvoj			
klasenje / zorenje	srednje zgodnje / srednje zgodnje		
prezimitev / tolerantnost na sušo	zelo dobra / zelo dobra		
št. klasov/m2; št.zrn /klasu ; TZT	0	0	0
Kakovost + + + + = zelo dobra (visoka)	0 = srednja	---- = zelo nizko	
Surove beljakovine: + +	Meljava: + +		
Sedimentacija: + +	Vpojnost: + +		
Število padanja: + + + +	Prinos volumna: + +		
Setvena norma:	**Kalivih zrn/m2**	**cca kg/ha**	
Zgodnje setve / konec sept.-začetek oktobra	240 - 270	160 - 180	
Optimalne setve / prva dekada oktobra	270 - 310	180 - 200	
Pozne setve/ sredina do konec oktobra	350 - 400	220 - 230	
N gnojenje (kg / ha, vključno z Nmin),	Razvojna faza (RF)		
Od setve do konca razraščanje	RF 13/25	70-80 / ha N	
Intenziven razvoj	RF 31/32	70-90 / ha N	
Klasenje	RF 49/59	70-80 / ha N	
Višina / stabilnost	Srednje visoka / Dobra		
Regulatorji rasti (če so dovoljeni in v primeru če so posevki zelo razraščeni ali visoki)			
Spomladanska setev RF 25	0,4 - 0,6 l/ha CCC		
Tolerantnost na bolezni ++++=zelo dobra (visoka) 0=srednja ---- = zelo nizko			
Pepelasta plesen : ++++	Septorija lista : +++		
Fuzarioze klasa : +	Rumena rja: ++ Rjava rja: ++		
DTR (Pyren. tritici-repentis) : ++			
Uporaba fungicida v intenzivni pridelavi	Septoria lista in DTR zajeti		
	RF 30/32 Fungicidi širokega spektra		
	RF 47/51 Kombinirani fungicidi		



Navodila so podana na osnovi raziskav vodenih na testnih postajah in upoštevajoč večletno dobro kmetijsko prakso. V primeru odstopanja jih je potrebno prilagoditi lokalnim razmeram. Za vse dodatne informacije pokličite svetovalno službo podjetja AgroMag d.o.o. 031 696 511.



SOBRED

OZIMNA PŠENICA - GOLICA B KAKOVOSTNEGA RAZREDA

Zgodnja sorta zelo tolerantna na visoke temperature in sušne razmere

SORTNA ZNAČILNOST

Zgodnja sorta, nižje rasti, primerna za vse tipe tal. Dobro tolerantna na vse gospodarsko nevarne bolezni.

TEHNOLOŠKE ZNAČILNOSTI

Odlična tolerantnost na stres povzročen z visokimi temperaturami in pomanjkanjem vlage v tleh. Zelo učinkovito črpa dušik iz tal in je uspešna tudi na slabše založenih tleh. Dobra prilagojenost na ekstenzivne in zelo intenzivne rastne razmere.

REKORDER PO PRIDELKU!!!



Razvoj					
klasenje / zorenje		srednje zgodno / srednje zgodno			
prezimitev / tolerantnost na sušo		zelo dobra / zelo dobra			
št. klasov/m2; št.zrn /klasu ; TZT		++	+	++	
Kakovost + + + + = zelo dobra (visoka)		0 = srednja		---- = zelo nizko	
Surove beljakovine:	+ +	Meljava:		+ +	
Sedimentacija:	+ +	Vpojnost:		+ +	
Število padanja:	+ + + +	Prinos volumna:		+ +	
Setvena norma:		**Kalivih zrn/m2**		**cca kg/ha**	
Zgodnje setve / konec septembra		300 - 350		200 - 220	
Optimalne setve/sredina oktobra		400 - 450		220 - 240	
Pozne setve/zadnja dekada oktobra		450 - 500		240 - 250	
N gnojenje (kg / ha, vključno z Nmin),		Razvojna faza (RF)			
Od setve do konca razraščanje		RF 13/25		70-90 kg / ha N	
Intenziven razvoj		RF 31/32		70-90 kg / ha N	
Klasenje		RF 47/49		50-60 kg / ha N	
Višina / stabilnost		nizka / dobra			
Regulatorji rasti:					
RF 31		0,4 – 0,5 CCC			
Tolerantnost na bolezni ++++=zelo dobra (visoka) 0=srednja ---- = zelo nizko					
Pepelasta plesen : +++		Septorija lista : 0			
Fuzarioze klasa : +++		Rumena rja: ++ Rjava rja: ++			
DTR (Pyren. tritici-repentis) : 0					
Uporaba fungicida v intenzivni pridelavi		Septoria lista in DTR zajeti			
		RF 30/32 Fungicidi širokega spektra			
		RF 47/51 Kombinirani fungicidi			
		RF 58/65 Fungicid na bazi azola+insekticid			

Navodila so podana na osnovi raziskav vodenih na testnih postajah in upoštevajoč večletno dobro kmetijsko prakso. V primeru odstopanja jih je potrebno prilagoditi lokalnim razmeram. Za vse dodatne informacije pokličite svetovalno službo podjetja AgroMag d.o.o. 031 696 511.



SU COSSANI
HIBRIDNA RŽ

Rekorder po pridelku in kakovosti

SORTNA ZNAČILNOST

V večletnih poskusih pri nemškem BSA ocenjen kot najbolj roden hibrid v sušnih pogojih rasti in razvoja 9/9.
Odlična krušna kakovost.
Primeren za setev na vseh tipih tal.
Primeren za ekstenzivni in intenzivno pridelavo.

TEHNOLOŠKE ZNAČILNOSTI

Odlična oploditev v fazi cvetenja in tolerantnost na gospodarsko najbolj nevarno bolezen rži Rženovega rožička.

REKORDER PO PRIDELKU IN KVALITETI!!!

Razvoj		Zelo dobro razrašča tudi pri nizkih temp.			
Višina / stabilnost		srednje / dobra			
klasenje / dozorevanje		srednje zgodaj / zgodaj			
št. klasov / m 2; št.zrn / klas ; TZT		+ + +	0	+	
Kakovost - Odlična zelo uravnotežena pekovska kakovost					
+ + + + = zelo dobra (visoka) 0 = srednja ---- = zelo nizko					
Amilogram viskozitet:	+ + + +	Hektolitrska masa:		+ +	
Vsebnost škroba:	0	Surove beljakovine:		0	
Število padanja:	+ + + +				
Čas setve:					
Lahka peščena tla, izrazito težka tla		Konec septembra - do sredine oktobra			
Dobra strukturna tla		Začetek do konec oktobra			
Setvena norma : Zrn/m2		**Zelo lahka tla**		**Dobra tla**	
Zgodnja setev / sredina septembra		160 - 190		160 - 190	
Optmalnen čas setve /kon. sept - zač. okt		**190 - 220 / 2.0 mio zrn ali 2 setveni enoti/ha**		**190 - 220 / 2.0 mio zrn ali 2 setveni enoti/ha**	
Pozna setev/ sred.okt - konec okt.		260 - 300		220 - 260	
N gnojenje (kg / ha, vključno z Nmin),		N gnojenje (kg / ha, vključno z Nmin),			
Od setve do konca razraščanje		RF 13/25		80-100 kg / ha N	
Intenziven razvoj		RF 32/37		30-50 kg / ha N	
Višina / stabilnost		Srednje visoka/dobra			
Regulatorji rasti - ob upoštevanju setvenih norm niso potrebni					
Tolerantnost na bolezni + + + + = zelo dobra (visoka) 0 = srednja ---- = zelo nizko					
Plesen	+++	Rjava rja		++	
Rynhosporium	++	Rženova glavnica		++	



Navodila so podana na osnovi raziskav vodenih na testnih postajah in upoštevajoč večletno dobro kmetijsko prakso. V primeru odstopanja jih je potrebno prilagoditi lokalnim razmeram. Za vse dodatne informacije pokličite svetovalno službo podjetja AgroMag d.o.o. 031 696 511 ali g. Alojza Glavača Mlinopek d.o.o. tel: 041 517 307



ELLEN

VEČREDNI OZIMNI JEČMEN

Rekorderka – odlična stabilnost in kvaliteta pridelka v vseh pridelovalnih pogojih

SORTNA ZNAČILNOST

Zgodnji krmni ječmen odlične rodnosti. HL teža na nivoju dvorednih sort. Prilagojen rastnim razmeram na vseh tipih tal. Hiter mladostni razvoj in zapiranje vrst.

TEHNOLOŠKE ZNAČILNOSTI

Odlična tolerantnost na pegavost in odlična tolerantnost na ječmenovo listno pegavost. SU ELLEN je odporna na viruse BaYMV-1 in BaYMV-2 ter visoko tolerantna na BaMMV virus.
Visoki in stabilni pridelki v intenzivni pridelavi. Dobro prenaša pozne setve.



Razvoj - velika moč razraščanja			
klasenje / zorenje	srednje zgodnje / zgodnje		
prezimitev / tolerantnost na sušo	zelo dobra / zelo dobra		
št. klasov/m2; št.zrn /klasu ; TZT	+	+++	+++
Optimalen čas setve	Konec septembra		
Setvena norma - zgodnja setev in dobra priprava tal 260-280 zrn/m^2, cca (160 - 180 kg/ha)			
- pozna setev, slabša priprava tal 320-360 zrn/m^2, cca (190 - 220 kg/h)			
Setvena norma:	**Kalivih zrn/m2**	**cca kg/ha**	
Zgodnje setve / konec septembra	260 - 280	160 - 180	
Optimalne setve/začetek oktobra	280 - 320	180 - 200	
Pozne setve/konec oktobra	360 - 380	220 - 240	
Gnojenje			
Jeseni za razkroj organske mase predposevka dodati	20 kg N / ha, po potrebi v kombinaciji z Mg (<pH) in Mn (> pH, lahka tla)		
Od setve do konca razraščanje	RF 25	50-60 kg / ha N	
Intenziven razvoj	RF 30/31	30-40 kg / ha N	
Klasenje	RF 47/49	40-60 kg / ha N	
Višina / stabilnost	Srednje visoka / Dobra		
Regulatorji rasti (če so dovoljeni in v primeru če so posevki zelo razraščeni ali visoki)			
RF 31/32	0,25 - 0,35 l Moddus		
RF 39/49	0,4 Moddus + 0,3 Camposan		
Tolerantnost na bolezni ++++=zelo dobra (visoka) 0=srednja ---- = zelo nizko			
Mozaik virus: +++	Plesen : ++++		
BYDV virus : ++++	Rje: ++		
Ramularia: ++	Rynchosporium : ++		
Uporaba fungicida v intenzivni pridelavi	RF 32 tebukonazol		
	RF 47/49 tebukonazol		
V primeru zgodnjih setev in tople jeseni priporočamo pregled in po potrebi zatiranje uši			

Navodila so podana na osnovi raziskav vodenih na testnih postajah in upoštevajoč večletno dobro kmetijsko prakso. V primeru odstopanja jih je potrebno prilagoditi lokalnim razmeram. Za vse dodatne informacije pokličite svetovalno službo podjetja AgroMag d.o.o. 031 696 511.



Rekorder

RUZENA

DVOREDNI OZIMNI JEČMEN

Leta 2019 prvič uvrščen na evropsko sortno listo kot najbolj rodna sorta dvorednega ječmena

SORTNA ZNAČILNOST

ZGODEN, PRODUKTIVEN IN STABILEN
Izjemno visok potencial rodnosti. V primerjalnih poskusih DBA ocenjen z najvišjo možno oceno (9). Povprečni pridelek vseh lokacij 3% višji od najboljšega standarda. Primerna za setev na vseh rastiščih. Odporna na poleganje. Pridelek zrnja atraktivnega izgleda in odlične kakovosti. Praviloma visoka HL teža zrnja.

TEHNOLOŠKE ZNAČILNOSTI

Odlična zdravost in kakovost slame.
Zelo hitro nalivanje zrnja in dobra tolerantnost na stres povzročen z primanjkljajem padavin. Primeren za gojenje v intenzivnih in ekstenzivnih pogojih.

Razvoj - velika moč razraščanja			
klasenje / zorenje	hitro / hitro		
prezimitev / tolerantnost na sušo	dobra / zelo dobra		
št. klasov/m2; št.zrn /klasu ; TZT	++++	+	++
Setvena norma:	**Kalivih zrn/m2**		**cca kg/ha**
Zgodnje setve / konec septembra	260 - 280		160 - 180
Optimalne setve/začetek oktobra	280 - 320		180 - 200
Pozne setve/konec oktobra	360 - 380		220 - 240
Gnojenje			
Jeseni za razkroj organske mase predposevka dodati	30 kg N / ha, po potrebi v kombinaciji z Mg (<pH) in Mn (> pH, lahka tla)		
Od setve do konca razraščanje	RF 25		70-90 kg / ha N
Intenziven razvoj	RF 30/31		30-40 kg / ha N
Klasenje	RF 47/49		40-60 kg / ha N
Višina / stabilnost	Srednje visoka / Dobra		
Regulatorji rasti (če so dovoljeni in v primeru če so posevki zelo razraščeni ali visoki)			
RF 31/32	0,3 - 0,6 l Modus		
RF 39/49	0,2 l Medax Top + 0,4 Cerone/Camposan		
Tolerantnost na bolezni ++++=zelo dobra (visoka) 0=srednja ---- = zelo nizko			
Mozaik virus : ++++	Plesen : +		
BYDV virus : ++	Rje: ++		
Ramularia : ++	Rynchosporium : ++		
Uporaba fungicida v intenzivni pridelavi	I - RF 32 – fungicid širokega spektra		
	II- RF 47/49 fung. proti Ramulariji in Fusar. sp		
Uporaba fungicida v ekstenzivni pridelavi	RF 39 – ko je formiran zastavičar		



Navodila so podana na osnovi raziskav vodenih na testnih postajah in upoštevajoč večletno dobro kmetijsko prakso. V primeru odstopanja jih je potrebno prilagoditi lokalnim razmeram. Za vse dodatne informacije pokličite svetovalno službo podjetja AgroMag d.o.o. 031 696 511.

Agromag-Brosura A5 SORTE 2022_Layout 1 13/09/2022 15:18 Page 10

Rekorder med dvorednimi ječmeni

KATHMANDU

DVOREDNI OZIMNI JEČMEN



Za vsa rastišča in vedno odlični pridelki

SORTNA ZNAČILNOST

V primerjalnih poskusih DBA ocenjen z najvišjo možno oceno (9). Povprečni pridelek vseh lokacij 2% višji od najboljšega standarda.
Zgoden, odporen na poleganje.
Pridelek odlične kakovosti.
Praviloma visoka HL teža zrnja.

TEHNOLOŠKE ZNAČILNOSTI

Stabilni pridelki na vseh rastiščih.
Prilagodljiv glede časa setve.



Razvoj - velika moč razraščanja			
klasenje / zorenje	srednje zgodno / srednje zgodno		
prezimitev / tolerantnost na sušo	zelo dobra / zelo dobra		
št. klasov/m2; št.zrn /klasu ; TZT	++++	+	++
Optimalen čas setve	Konec septembra		
Setvena norma - zgodnja setev in dobra priprava tal 260-280 zrn/m², cca (160 - 180 kg/ha) - pozna setev, slabša priprava tal 320-360 zrn/m², cca (210 - 220 kg/h)			
Setvena norma:	**Kalivih zrn/m2**	**cca kg/ha**	
Zgodnje setve / konec septembra	260 - 280	160 - 180	
Optimalne setve/začetek oktobra	280 - 320	180 - 200	
Pozne setve/konec oktobra	360 - 380	220 - 240	
Gnojenje			
Jeseni za razkroj organske mase predposevka dodati	20 kg N / ha, po potrebi v kombinaciji z Mg (<pH) in Mn (> pH, lahka tla)		
Od setve do konca razraščanje	RF 25	70-90 kg / ha N	
Intenziven razvoj	RF 30/31	30-40 kg / ha N	
Klasenje	RF 47/49	40-60 kg / ha N	
Višina / stabilnost	Srednje visoka / Dobra		
Regulatorji rasti (če so dovoljeni in v primeru če so posevki zelo razraščeni ali visoki)			
RF 31/32	0,4 - 0,5 l Modus		
RF 39/49	0,4 l Medax Top + 0,2 Camposan		
Tolerantnost na bolezni ++++=zelo dobra (visoka) 0=srednja ---- = zelo nizko			
Mozaik virus: ++++	Plesen : +		
BYDV virus : --	Rje: -		
Ramularia: +	Rynchosporium : +		
Uporaba fungicida v intenzivni pridelavi	RF 32 prvo škroplj. – fungicid širokega spektra		
	RF 47/49 škroplj. proti Ramulariji		
V primeru zgodnjih setev in tople jeseni priporočamo pregled in po potrebi zatiranje uši			

Navodila so podana na osnovi raziskav vodenih na testnih postajah in upoštevajoč večletno dobro kmetijsko prakso. V primeru odstopanja jih je potrebno prilagoditi lokalnim razmeram. Za vse dodatne informacije pokličite svetovalno službo podjetja AgroMag d.o.o. 031 696 511.

REZULTATI DEMO POSKUSOV 2022

ANTON MEDVED /PŠENICA - Stražgonjca — Setev: 28.10.2021 / Spravilo: 18.07.2022, Tip tal: zelo težek

SORTA	Vlaga %	HT	Beljakovine %	FN	SEDIMENT.	PRIDELEK kg/ha
FAUSTUS	13,0	79,3	13,0	337	32	8.626
ALVIUS	12,7	80,3	14,9	342	47	8.027
EMBLEM	13,0	79,2	12,6	348	36	7.764
SOBRED	12,4	77,8	13,1	323	33	7.817
GHAYTA	13,0	81,2	15,5	357	50	8.156
ASPEKT	11,9	79,3	13,6	317	39	7.941
GEO	12,0	80,6	15,5	335	47	7.774

ANTON MEDVED /JEČMEN - Stražgonjca — Setev: 28.10.2021 / Spravilo: 30.06.2022, Tip tal: zelo težek

SORTA	Vlaga %	HT	PRIDELEK kg/ha
VIOLA	13,4	64,3	7.622
ELLEN	13,7	66,0	8.423
KATHMANDU	12,7	67,3	8.029
RUZENA	13,2	68,1	8.499

DAMJAN COPOT /PŠENICA - Kokorič — Setev: 24.10.2021 / Spravilo: 19.07.2022, Tip tal: težek

SORTA	Vlaga %	HT	Beljakovine %	FN	SEDIMENT.	PRIDELEK kg/ha
FAUSTUS	13,0	79,2	12,6	322	34	7.394
EMBLEM	13,0	78,9	13,0	360	37	7.853
GHAYTA	11,4	80,5	15,1	351	55	7.456
ASPEKT	11,9	79,0	12,2	324	39	7.317
GENIUS	12,0	80,0	15,5	366	49	7.476

DAMJAN COPOT /JEČMEN - Kokorič — Setev: 24.10.2021 / Spravilo: 30.06.2022, Tip tal: težek

SORTA	Vlaga %	HT	PRIDELEK kg/ha
ESPRIT	11,8	64,2	7.536
ELLEN	11,3	66,2	7.573
KATHMANDU	12,0	66,6	7.110
RUZENA	11,9	68,2	7.528

DENIS RUDENKO/ Bakovci — Setev: 24.10.2021 / Spravilo: 13.07.2022, Tip tal: zelo lahek

SORTA	Vlaga %	HT	Beljakovine %	FN	SEDIMENT.	PRIDELEK kg/ha
ALVIUS	13,0	80,4	14,8	420	49	6.503
GENIUS	14,0	81,0	15,8	336	51	6.548
RENAN	12,4	80,9	15,3	369	49	6.964
GHAYTA	13,0	80,9	15,9	366	52	7.186
GEO	13,0	81,5	15,5	305	50	6.878

PANVITA /PŠENICA — Setev: 25.10.2021, Spravilo: 21.7.2022

SORTA	Vlaga %	HT	Beljakovine %	FN	SEDIMENT.	PRIDELEK kg/ha
GHAYTA	11,4	73,0	14,7	336	57	7.754
GEO	11,3	70,0	14,2	288	53	6.662
RENAN	11,5	74,0	14,3	309	58	6.877
EMBLEM	11,9	80,0	13,1	335	45	8.182
SOBRED	11,7	76,0	11,7	311	30	8.210
GENIUS	11,7	76,0	13,7	339	53	7.554
FAUSTUS	11,5	75,0	13,0	324	44	8.027
ALVIUS	11,0	76,0	14,3	326	54	5.388

KSS MURSKA SOBOTA - PŠENICA - NA NJIVI G.POREDOŠ TOMAŽA - PREDANOVCI 6/PŠENICA — Setev 28.10.2021 / Spravilo 14.07.2022

SORTA	Vlaga %	HT	Beljakovine %	FN	SEDIMENT.	PRIDELEK kg/ha
SOBRED	13,8	77,5	13,7	69,3	39,2	8.907
ALVIUS	13,9	79,6	14,8	67,2	48,4	7.699
FAUSTUS	14,0	78,4	14,3	68,7	42,8	8.028
GENIUS	14,0	78,4	15,4	71,1	36,0	8.901
ASPEKT	13,8	79,1	15,8	66,4	54,4	7.840
RENAN	13,6	76,1	15,7	68,2	52,9	7.793
GHAYTA	14,0	79,4	14,3	68,7	42,8	7.605
GEO	13,5	77,9	15,5	66,3	52,7	7.746
EMBLEM	13,7	78,1	14,1	69,0	49,1	8.075

KSS MURSKA SOBOTA - JEČMEN - NA NJIVI G.POREDOŠ TOMAŽA - PREDANOVCI 6/PŠENICA - Setev 28.10.2021 / Spravilo 01.07.2022 — Setev 28.10.2021 / Spravilo 01.07.2022

SORTA	Vlaga %	HT	PRIDELEK kg/ha
KATHMANDU	13,3	61,3	6.863
RUZENA	13,5	63,5	7.181
ELLEN	13,3	63,2	6.727
VIOLA	13,4	64,4	7.045
ESPRIT	13,8	63,9	7.454

Rekorder

FERVENTE

OZIMNI OVES

Vrhunski pridelki debelo zrnatega ovsa



SORTNA ZNAČILNOST

Izjemno visok potencial rodnosti. Zgoden, odporen na poleganje. Pridelek odlične kakovosti primeren za industrijsko proizvodnjo kosmičev in krmo

TEHNOLOŠKE ZNAČILNOSTI

Stabilni pridelki na vseh rastiščih. Odlična zdravost in kakovost slame.
Zelo hitro nalivanje zrnja in dobra tolerantnost na stres povzročen z primanjkljajem padavin.
Primeren za gojenje v intenzivnih in ekstenzivnih pogojih.

Razvoj - velika moč razraščanja		
klasenje / zorenje	hitro / hitro	
prezimitev / tolerantnost na sušo	dobra / zelo dobra	
Setvena norma:	**Kalivih zrn/m2**	**cca kg/ha**
Zgodnje setve / konec septembra	260 - 280	120 - 130
Optimalne setve/začetek oktobra	280 - 320	140 - 150
Gnojenje		
Jeseni za razkroj organske mase predposevka dodati	30 kg N / ha, po potrebi v kombinaciji z Mg (<pH) in Mn (> pH, lahka tla)	
Od setve do konca razraščanje	RF 25	70-90 kg / ha N
Intenziven razvoj	RF 30/31	30-40 kg / ha N
Višina / stabilnost	Srednje visoka / Dobra	
Regulatorji rasti (če so dovoljeni in v primeru če so posevki zelo razraščeni ali visoki)		
RF 32/39	0,7 - 1,2 l CCC 720	
Tolerantnost na bolezni, viruse ++++=zelo dobra (visoka) 0=srednja ---- = zelo nizko		
BYDV virus : --	Plesen : +	
Septoria : +++	Rje: +++	
Uporaba fungicida	Po potrebi	
Uporaba herbicida	Čim prej EC 13/21	

RAZVOJNE FAZE ŽIT



